

MS ARNAV SEEDS

Crop-Onion

Stage-Truthfull

Variety-Bhima Shakti

Season-Rabbi

Duration-120 To 125 Days



कांदा पीक व्यवस्थापन (Onion Crop Management)

विवरण (Description)	तपशील (Details)
जमिनीची निवड (Soil Selection)	मध्यम कसदार, पाण्याचा चांगला निचरा होणारी (Medium fertile, well-drained).
बियाण्याचे प्रमाण (Seed Rate)	२.५ ते ३ किलो प्रती एकर (2.5 to 3 kg per acre).
रोप तयार करणे (Nursery Preparation)	गादी वाफे तयार करून बियाणे 1 ते 5 cm खोल पेरावे. ट्रायकोडर्मा किंवा कार्बन्डीझम जमिनीत टाकून पेरणी करावी (Prepare raised beds and sow seeds 1 to 5 cm deep. Use Trichoderma or Carbendazim in the soil before sowing).
जमिनीची मशागत (Land Preparation)	नांगरणी, कोळपणी करून, एकरी १० टन शेणखत व गंधक टाकून जमीन तयार करावी (Plow, harrow, and prepare the soil by adding 10 MT farmyard manure and sulfur per acre).
पाणी व्यवस्थापन (Water Management)	रब्बी हंगामात १० ते १२ दिवसांनी चांगला वापसा झाल्यावर गरजेनुसार पाणी देणे (In the Rabi season, water as needed after 10 to 12 days when the soil moisture is optimal).
खत व्यवस्थापन (Fertilizer Management)	माती परीक्षण करून, NPK + गंधक + मॅक्रोन्यूट्रियन्ट दोन टप्प्यात घ्यावे. नत्रयुक्त खताचा अति वापर व उशीराणे वापर साठवणूक व इतर दोष (जसे डोंगळे येणे /Dubling) येऊ शकतो (After soil testing, apply NPK + Sulfur + Micronutrients in two stages. Untimely or late use of nitrogenous fertilizer can cause
पीक काढणी व साठवणूक (Harvesting & Storage)	शेवटचे दोन पाणी चोपट कमी देऊन, पाथीच्या माना पडल्या की काढणी करावी. साठवणी पूर्वी कांदा सावलीत चांगला सुकवावा. साठवणूक खेळत्या हवेत कमी तापमानात करावी (Reduce the last two waterings, harvest when the neck of the leaf (path) drops. Dry the onion well in the shade before storage. Store in
उत्पादन (Yield)	१५० ते २०० क्विंटल प्रती एकर (150 to 200 Quintals per acre).

टीप - वातावरणाच्या बदला नुसार कांदा तज्ञाचा सल्ला घेऊनच खत व फवारणी चे नियोजन करणे.

Produced, Packed and Marketed By
MS ARNAV SEEDS

**Property No. 341, Ward No. 2, At. Walana Post. Kendra BK., Tal. Sengaoon,
Dist. Hingoli 431703 Maharashtra Call.72767 65781**